

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТИ (СВДС)

СВДС - гибель ребенка в возрасте до 1 года при отсутствии признаков болезни и без особенностей на вскрытии

Установлено, что максимальный риск СДВС приходится на первые 2-4 месяца жизни, плавно снижаясь к 6 и становится близок нулю после 9 месяцев жизни

Случаи СВДС всегда под тщательным контролем со стороны медиков

Иногда за внезапной смертью младенца хотят скрыть преднамеренное преступление

Планомерные исследования случаев внезапной смерти у детей позволили выявить ряд факторов повышенного риска развития СВДС:

- сон на животе
- излишнее укутывание, чрезмерно теплая, тесная одежда
- переохлаждение, перегрев
- слишком мягкое основание колыбели
- случаи беспричинной остановки дыхания (сердца), потерь сознания у ребенка, его братьев или сестер
- осложненные, длительные роды, проблемы развития во время беременности у ребенка, недоношенность
- употребление алкоголя, курение матери во время беременности, а так же, воздействие табачного дыма на ребенка
- искусственное вскармливание, неспособность брать грудь
- возраст 2-4 месяца, риск сохраняется вплоть до 6 месяцев

ВНИМАНИЕ!

При первых признаках прекращения дыхания (более 20 секунд) вызовите скорую помощь

103 112 03
с любого оператора

